

PET ÜRÜNLERİ

# VADEMEEKUM



*sağlıklı nesiller için...*



# İÇİNDEKİLER



## ANTİBAKTERİYEL ÜRÜNLER

VETENROSİD CAT-DOG ORAL TABLET

VETENROSİD DOG ORAL TABLET



## ANTİPARAZİTER ÜRÜNLER

FİPROTEAM CAT DAMLATMA ÇÖZELTİSİ

FİPROTEAM DOG DAMLATMA ÇÖZELTİSİ

OUT-TİCK DAMLATMA ÇÖZELTİSİ

SELFOLD %6 DAMLATMA ÇÖZELTİSİ

TENİAKİLL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

QUİNTEL ORAL TABLET



## DİĞER ÜRÜNLER

COXDUO CAT ORAL SÜSPANSİYON

COXDUO DOG ORAL SÜSPANSİYON

MARNEUKİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

PAİNCARP DOG PALATABLE ORAL TABLET

# ANTİBAKTERİYEL ÜRÜNLER



# Vetenrosid CAT - DOG

Oral Tablet

Enrofloksasin

## BİLEŞİMİ:

50 mg enrofloksasin

## KULLANIM SAHASI:

**Kedi ve köpeklerde** enrofloksasine duyarlı gram pozitif ve gram negatif (*Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Staphylococcus spp.*) bakterilerin yol açtığı sindirim, solunum, ürogenital sistem, otitis eksterna, deri ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde tek veya kombine olarak kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Oral yolla uygulanır.

Farmakolojik dozu;  
günde 1 kez 5 mg enrofloksasin/kg  
vücut ağırlığıdır,

Pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığına  
1 tablet verilir.

## TAKDİM ŞEKLİ:

10 tabletlik 1 adet Alu-Alu blister



ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE  
UZMANLARIN BİLDİĞİ YOL



# Vetenrosid DOG

Oral Tablet

Enrofloksasin

## BİLEŞİMİ:

150 mg enrofloksasin

## KULLANIM SAHASI:

**Köpeklerde** enrofloksasine duyarlı gram pozitif ve gram negatif (*Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Staphylococcus spp.*) bakterilerin yol açtığı sindirim, solunum, ürogenital sistem, otitis eksterna, deri ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde tek veya kombine olarak kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Oral yolla uygulanır.

Farmakolojik dozu;  
1 kez 5 mg enrofloksasin/kg  
vücut ağırlığıdır,

Pratik olarak her 30 kg vücut ağırlığına  
1 tablet verilir.

## TAKDİM ŞEKLİ:

10 tabletlik 1 adet Alu-Alu blister



ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE  
UZMANLARIN BİLDİĞİ YOL



# ANTİPARAZİTER ÜRÜNLER



# Fiproteam Cat

Damlatma Çözeltisi Fipronil / (S)-Metopren



➤ **BİLEŞİMİ:**  
100 mg fipronil ve  
120 mg (S)-metopren

➤ **KULLANIM SAHASI:**

- Kedide** pire, kene ve ısırıcı bitlerin tek başına ve/veya karma enfestasyonlarına karşı kullanılır.
- ✓ Pire (*Ctenocephalides spp.*) enfestasyonlarının kontrolü ve tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Erişkin pirelerin neden olduğu yeni enfestasyonlarına karşı insektisidal etkinlik 4 hafta sürer. Uygulamayı takiben 6 hafta süresince erişkin pire yumurtalarında embriyonal gelişmenin durdurulmasında (ovisidal etki), larva ve pupa dönemlerinde gelişmenin durdurulmasında (larvasidal etki) etkilidir.
  - ✓ Kene enfestasyonlarında (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* ve *Rhipicephalus sanguineus*) akarisit ve koruyucudur. Deneysel verilere göre kenelere karşı 2 haftaya kadar kalıcı akarisit etkinliğe sahiptir.
  - ✓ Bit (*Felicola subrostratus*) enfestasyonu tedavisinde kullanılır.
  - ✓ Ürün, Pire Alerjik Dermatit (FAD) kontrolüne yönelik bir tedavi stratejisinin parçası olarak kullanılabilir.

➤ **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**

Farmakolojik dozu fipronil için 5 mg/kg vücut ağırlığı ve (S)-metopren için 6 mg/kg vücut ağırlığıdır. İki omuz arasında, ense kökü derisine tek doz topikal olarak uygulanır.

Pratik uygulama dozu kedi vücut ağırlığına bakılmaksızın 0,5 ml (1 adet tüp)'dir.

➤ **TAKDİM ŞEKLİ:**

0,5 ml ürün içeren 3'er adet beyaz tüp plastik seperatörde sunulmaktadır.



## DAMLAT ŞİMDİ



# Fiproteam Dog

Damlatma Çözeltisi Fipronil / (S)-Metopren



➤ **BİLEŞİMİ:**  
100 mg fipronil ve  
90 mg (S)-metopren

## KULLANIM SAHASI:

**Köpekte** pire, kene ve ısırıcı bitlerin tek başına ve/veya karma enfestasyonlarına karşı kullanılır.

- ✓ Pire (*Ctenocephalides spp.*) enfestasyonlarının kontrolü ve tedavisinde kullanılır.
- ✓ Erişkin pirelerin neden olduğu yeni enfestasyonlarına karşı insektisidal etkinlik 4 hafta sürer. Uygulamayı takiben 8 hafta süresince erişkin pire yumurtalarında embriyonal gelişmenin durdurulmasında (ovisidal etki), larva ve pupa dönemlerinde gelişmenin durdurulmasında (larvasidal etki) etkilidir.
- ✓ Kene enfestasyonlarında (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* ve *Rhipicephalus sanguineus*) akarisit ve koruyucudur. Deneysel verilere göre kenelere karşı 4 haftaya kadar kalıcı akarisit etkinliğe sahiptir.
- ✓ Bit (*Trichodectes canis*) enfestasyonu tedavisinde kullanılır.
- ✓ Ürün, Pire Alerjik Dermatitisi (FAD) kontrolüne yönelik bir tedavi stratejisinin parçası olarak kullanılabilir.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Farmakolojik dozu fipronil için 6,7 mg/kg vücut ağırlığı ve (S)-metopren için 6 mg/kg vücut ağırlığıdır. İki omuz arasında, ense kökü derisine tek doz topikal olarak uygulanır.

Farklı ağırlıklardaki köpeklere gerekli dozun verilmesini sağlamak için 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml ve 4,02 ml ürün içeren tek dozluk tüplerde sunulmaktadır.

## TAKDİM ŞEKLİ:

0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml ve 4,02 ml ürün içeren 3'er adet beyaz tüp plastik seperatörde sunulmaktadır.



# DAMLAT ŞİMDİ





# Out-Tick

Damlatma Çözeltisi

İmidakloprid - Permetrin

## BİLEŞİMİ:

100 mg imidakloprid ve  
500 mg permetrin

## KULLANIM SAHASI:

**Köpeklerde** kene, pire, sivrisinek ve tatarcık gibi dış parazitlere karşı kullanılır. Etkili olduğu dış parazitler şunlardır:

- ✓ Pire (*Ctenocephalides spp.*) infestasyonlarının kontrolü ve tedavisi
- ✓ Pire alerjik dermatitin kontrolü ve tedavisi, larvasid etkisi ve çevresel kontrol
- ✓ Bit (*Trichodectes canis*) enfestasyonu tedavisinde,
- ✓ Kene enfestasyonlarında (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* ve *Dermacentor reticulatus*) akarisit ve kovucu,
- ✓ Kum sinekleri (*Phlebotomus spp.*),
- ✓ Sivrisineklere (*Aedes aegypti* ve *Culex pipiens*),
- ✓ Karasineklere (*Stomoxys calcitrans*) kovucu
- ✓ Vektör kene ve sineklerin taşıdığı hastalık risklerinin azaltılması (*ehrlichiosis* ve *leishmaniasis* profilaksisi)

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Farmakolojik dozu imidakloprid 10 mg/kg vücut ağırlığı ve permetrin 50 mg/kg vücut ağırlığıdır, 4-10 kg ağırlığındaki köpeklerde içeriğin tamamı iki omuz arasında, ense kökü derisine tek bir noktaya, 10 kg üzerindeki köpeklerde ise omuzdan kuyruk başlangıcına kadar sırtta dört ayrı noktaya eşit şekilde uygulanır.”

Farklı ağırlıklardaki köpeklere gerekli dozun verilmesini sağlamak için 1 ml, 2,5 ml, 4 ml ve 6 ml ürün içeren tek dozluk tüplerde sunulmaktadır.

## TAKDİM ŞEKLİ:


1 ml, 2,5 ml, 4 ml ve 6 ml ürün içeren 3'er adet beyaz tüp plastik seperatörde sunulmaktadır.



PARAZİTLE MÜCADELEDE TAM NOT



# Selfold



Damlatma Çözeltisi

Selamektin

## BİLEŞİMİ:

60 mg selamektin

## KULLANIM SAHASI:

Altı haftalıktan büyük köpek ve kedilerde aşağıdaki enfeksiyon ve enfestasyonlar için endikedir:

- ✓ Pire (*Ctenocephalides spp.*) enfestasyonlarının kontrolü ve tedavisi
- ✓ Pire alerjik dermatitin kontrolü ve tedavisi
- ✓ Dirofilaria immitis ile meydana gelen kalp kurdu enfeksiyonunun (*Heartworm*) önlenmesi
- ✓ Kulak uyuzu (*Otodectes cynotis*) enfestasyonlarının tedavisi
- ✓ Erişkin kancalı kurtlar (*Ancylostoma tubaeforme*) ve erişkin askaritler (*Toxocara cati, Toxocara canis*) ile meydana gelen enfeksiyonların tedavisi
- ✓ Bit (*Felicola subrostratus, Trichodectes canis*) enfestasyonlarının tedavisi
- ✓ Köpeklerde uyuz enfestasyonlarının (*Sarcoptes scabiei*) tedavisi

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Farmakolojik dozu 6 mg selamektin/kg vücut ağırlığıdır, iki omuz arasında, ense kökü derisine tek doz topikal olarak uygulanır.

Farklı ağırlıklardaki kedi ve köpeklere gerekli dozun verilmesini sağlamak için 0,25 ml ve 0,75 ml ürün içeren tek dozluk tüplerde sunulmaktadır.

## TAKDİM ŞEKLİ:

0,25 ml veya 0,75 ml ürün içeren 3'er adet beyaz tüp plastik seperatörde sunulmaktadır.



PROFESYONELLERİN ARADIĞI  
ÖZEL ÇÖZÜM





# tenia kill

Enjeksiyonluk Çözelti

Prazikuantel

## BİLEŞİMİ:

56,80 mg prazikuantel

## KULLANIM SAHASI:

**Kedi ve köpekte** prazikuantale duyarlı *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Hydatigena (Taenia) taeniaeformis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia ovis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.* ve *Joyeuxiella pasqualei* gibi gastrointestinal sestodların neden olduğu hastalıkların tedavisi ve kontrolünde kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kedi ve köpekte farmakolojik dozu 5.68 mg prazikuantel/kg vücut ağırlığıdır.

Pratik olarak 10 kg vücut ağırlığına 1 ml kas içi (IM) ve deri altı (SC) uygulanır.

## TAKDİM ŞEKLİ:

20 ml ve 50 ml



SESTODLARLA MÜCADELEDE  
ETKİLİ ÇÖZÜM



Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

# Quintel

Oral Tablet

Prazikuantel + Fenbendazol

## BİLEŞİMİ:

50 mg prazikuantel ve  
500 mg fenbendazol

## KULLANIM SAHASI:

**Köpek ve kedide** aşağıdaki şerit ve yuvarlak kurtların neden olduğu paraziter enfeksiyonların tedavisi ve kontrolünde kullanılır:

### ✓ Sindirim sistemi sestodları:

*Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocestoides spp.*

### ✓ Sindirim sistemi nematodları:

Askaritlerden *Toxocara cati*'nin erişkinlerine, *Toxascaris leonina* ve *Toxocara canis*'in erişkin ve larvalarına, Kancalı kurtlardan *Ancylostoma caninum* ve *Uncinaria stenocephala*'nın erişkin ve larvalarına ve *Trichuris vulpis*'in erişkin formuna etkilidir.

Ayrıca köpeklerde *Giardia* protozoanlarının ve kedilerde akciğer enfeksiyon etkeni olan *Aelurostrongylus abstrusus*'ların kontrolünde yardımcı ilaç olarak kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Köpek ve kedide oral yol ile uygulanır.

Farmakolojik dozu;

5 mg prazikuantel/kg vücut ağırlığı ve  
50 mg fenbendazol/kg vücut ağırlığıdır.

Pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığına  
1 tablet verilir.

## TAKDİM ŞEKLİ:

10 tabletlik 5 adet Alu-Alu blister (50 tablet)



## FARKI HİSSEDİN



# DİĞER ÜRÜNLER





# COXDUO CAT

Oral Süspansiyon

Meloksikam

## BİLEŞİMİ:

0,50 mg meloksikam

## KULLANIM SAHASI:

**Kedi:** Ortopedik ve yumuşak doku cerrahisi gibi cerrahi girişimler sonrası görülebilecek hafif ve orta derecedeki post-operatif ağrı ve enflamasyonun azaltılması, akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında görülebilecek ağrı ve enflamasyonun hafifletilmesi amacıyla kullanılır.

**Guinea pig (Kobay):** Erkek kısırlaştırma gibi yumuşak doku cerrahisiyle ilişkili hafif ve orta derecedeki post-operatif ağrının azaltılması için kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Cerrahi operasyon sonrası post-operatif ağrı ve yangıda:

Günde bir kez, 4 gün boyunca 0,05 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı farmakolojik dozunda olmak üzere 5 kg'a 0,5 ml oral yol ile uygulanır.

**Akut kas-iskelet sistemi bozuklukları:**



	Başlangıç Dozu 0,2 mg meloksikam / kg farmakolojik doz	Devam Dozu 0,05 mg meloksikam / kg farmakolojik doz
--	--	---

Vücut Ağırlığı	Pratik Doz	Pratik Doz
1 kg	0,4 ml	0,1 ml
5 kg	2 ml	0,5 ml

**Kronik kas-iskelet sistemi bozuklukları:**



	Başlangıç Dozu 0,1 mg meloksikam / kg farmakolojik doz	Devam Dozu 0,05 mg meloksikam / kg farmakolojik doz
--	--	---

Vücut Ağırlığı	Pratik Doz	Pratik Doz
1 kg	0,2 ml	0,1 ml
5 kg	1 ml	0,5 ml

İlaç doğrudan ağza verilir (yutturulur) ya da mamaya karıştırılarak uygulanır.

## TAKDİM ŞEKLİ:

1 ml dozajlama pipeti ile birlikte; 50 ml'lik beyaz renkli plastik şişe



## AĞRIYI SİZ YÖNETİN





# COXDUO DOG

Oral Süspansiyon Meloksikam

➤ **BİLEŞİMİ:**  
1,50 mg meloksikam

➤ **KULLANIM SAHASI:**  
**Köpeklerde** akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında enflamasyon ve ağrının hafifletilmesi için kullanılır.

➤ **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**  
Başlangıçta, ilk gün 0,2 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı farmakolojik dozunda oral yol ile tek bir uygulama yapılır.

Tedaviye, günde bir kez 0,1 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı farmakolojik devam dozunda oral uygulama ile (24 saatlik aralıklarla) devam edilir.



	Başlangıç Dozu 0,2 mg meloksikam / kg farmakolojik doz	Devam Dozu 0,1 mg meloksikam / kg farmakolojik doz
Vücut Ağırlığı	Pratik Doz	Pratik Doz
5 kg	0,7 ml	0,4 ml
10 kg	1,3 ml	0,7 ml

İlaç doğrudan ağza verilir (yutturulur) ya da mamaya karıştırılarak uygulanır.

➤ **TAKDİM ŞEKLİ:**  
5 ml dozajlama pipeti ile birlikte; 100 ml'lik beyaz renkli plastik şişe



## AĞRIYI SİZ YÖNETİN



# MARNEUKİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Maropitant

## ► BİLEŞİMİ:

10 mg maropitanta eşdeğer 14,48 mg maropitant sitrat monohidrat

## ► KULLANIM SAHASI:

**Köpek ve kedide;**

- ✓ Perioperatif kusma ve bulantının önlenmesi ve tedavisi
- ✓ Kemoterapiden kaynaklanan kusmanın önlenmesinde
- ✓ İnfeksiyonlara (parvovirus vs) bağlı akut kusmanın tedavisi ve önlenmesinde
- ✓ Sistemik hastalıklar (gastroenteritis, akut pankreatitis, kolangitis vs) ile ilişkili akut kusmanın tedavisi ve önlenmesinde
- ✓ Diğer klinik hastalıklarda kusmanın önlenmesi ve tedavisi (üremi, böbrek yetmezliği, piyometra, diabetik ketoasidosis, hiperkalsemi, adrenal yetmezlik, gastrointestinal neoplazi, sentral sinir sistemi hastalıkları, intrakraniyal basıncın artması) ilaçlar ile meydana gelen kusmanın tedavisinde

## ► KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Köpek ve kedide 1 mg/kg vücut ağırlığı farmakolojik dozunda,

Pratik olarak; 1 ml/10 kg vücut ağırlığı dozunda günde bir kez deri altı uygulanır.

## ► TAKDİM ŞEKLİ:

20 ml



**SELEKTİF  
KUSMA ÖNLEYİCİ**



# PAİNCARP DOG

Palatable Oral Tablet



Karprofen

➤ **BİLEŞİMİ:**  
50 mg karprofen

➤ **KULLANIM SAHASI:**  
**Köpeklerde** kas-iskelet sistemi bozuklukları ve dejeneratif eklem hastalıklarının yol açtığı yangının ve ağrıların azaltılmasında ve yumuşak doku cerrahisini takiben post operatif ağrının yönetiminde parenteral analjezinin takibi olarak kullanılır.

➤ **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**  
Köpeklerde oral yol ile uygulanır.  
Karprofenin farmakolojik dozu  
Köpeklerde 4 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Pratik olarak 12,5 kg'a 1 tablet uygulanır.

➤ **TAKDİM ŞEKLİ:**  
50 tablet içeren  
beyaz renkli plastik şişe



AĞRIYA KARŞI TEK CEVAP:  
**PAİNCARP**

Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

EastPharma 



Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.

**DEVA HOLDİNG A.Ő.**

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 34 89 • [www.vetas.com.tr](http://www.vetas.com.tr)