

Prospektüs

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır.

HEPANKTON **Enjeksiyonluk Çözelti** Koleretik

BİLEŞİMİ

HEPANKTON Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı-sarı renkli berrak enjeksiyonluk çözelti olup, beher ml'de etkin madde olarak 100 mg menbuton içermektedir. Yardımcı madde olarak antimikrobiyal amaçlı 2 mg klorokresol ve antioksidan amaçlı olarak da 1 mg sodyum metabisulfit kullanılmıştır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler:

Menbuton, dięer adıyla genabilik asit, bir oksobutirik asit türevidir olup eksito-sekretuar koleretik, tripsinojen ve pepsinojen gibi işlev görür. Enjekte edildikten sonra normal değerlerine kıyasla safra, pankreas ve peptik sekresyonlarını 2-5 kat artırır. Gıdaların geçişini ve sindirimini kolaylaştırır. Karacięer detoksifiyanı olarak işlev görür.

Farmakokinetik özellikler:

Sığırlara damar içi (iv) yoldan uygulanmasının ardından bir saat sonra plazma konsantrasyonu 20 mg/l olup, 8 saatte 1 mg/l'nin altına düşmektedir. Eliminasyon yarılanma ömrü, farklı türlerde 8 saat olarak hesaplanmıştır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sığır, at, koyun ve keçilerde sindirim bozukları ve karacięer yetmezlięi sırasında hepatik sindirim aktivitesinin uyarılmasında kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Buzaęı (6 aya kadar), koyun ve keçilerde kg canlı aęırlığa 10 mg menbuton hesabıyla, 10 kg canlı aęırlığa 1 ml kas içi veya damar içi uygulanır.

6 aydan büyük sığırlarda kg canlı aęırlığa 5 - 7.5 mg menbuton hesabıyla, 15 - 20 kg canlı aęırlığa 1 ml damar içi uygulanır.

Atlarda kg canlı aęırlığa 2.5 - 5 mg menbuton hesabıyla, 20 - 40 kg canlı aęırlığa 1 ml damar içi uygulanır.

Veteriner hekim tavsiyesine göre 24 saat sonra tekrarlanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Atlara sadece damar içi (iv) enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. Yan etkilerden kaçınmak için intravenöz (damar içi) uygulama yavaş (en az 1 dakika) yapılmalıdır. Kas içi uygulamalarda aynı uygulama bölgesine 20 ml'den fazla enjekte edilmemelidir.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelięin son üçte birinde uygulanmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Damar içi enjeksiyon uygulamalarında tükürük artışı, lakrimasyon, titreme, istemsiz idrar yapma ve dışkılama görülebilir. Kas içi uygulamalarda enjeksiyon yerinde reaksiyon riski (ödem, hemorajik infiltrasyon ve nekrotik lezyonlar) görülebilir. Seyrek olarak huzursuzluk, artan solunum hız artışı ve nadir durumlarda özellikle sığırlarda hızlı intravenöz enjeksiyonun ardından geçici dekübit oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kalsiyum tuzları, prokain penisilin veya B grubu vitamin içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Kardiyak sorunu olan hayvanlarda veya gebeliğin ilerleyen dönemlerinde kullanılmamalıdır. Etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bilinmemektedir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış tıbbi ürün ve ürünün atıkları yerel yasaların gerekliliklerine göre imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışılmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Kazara kendine enjeksiyon yapılması durumunda acilen tıbbi yardım alınmalıdır. Etkin maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişiler temastan kaçınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında, orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü 24 aydır. Ambalaj açıldıktan sonra 25°C'nin altında saklandığında raf ömrü 28 gündür. Buzdolabında ve/veya derin dondurucuda saklanmamalıdır. Ürünün tıpası en fazla 40 kez delinebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 100 mL ve 250 mL'lik şeffaf Tip I cam flakonlarda satışa sunulmaktadır. 100 mL'lik flakonlar kırmızı renkli klorobutil 20 mm lastik tıpa ve beyaz flip-off kapak ile kapatılmıştır. 250 mL'lik flakonlar ise gri renkli bromobutil 32 mm lastik tıpa ve beyaz flip-off kapak ile kapatılmıştır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenahaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 18.02.2020

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 18.02.2020 – 029/0012

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. Karaağaç Mah. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Telefon: 0 282 735 20 00 Faks: 0 282 758 30 59