

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

NEO- KORT

Göz ve Kulak Damlası

Antibakteriyel + Steroid Damla

BİLEŞİMİ

NEOKORT Göz ve Kulak Damlası, steril, berrak ve renksiz bir çözelti olup beher ml’de 1mg Deksmetazon 21-fosfat ile 3.5 mg Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Lokal antibakteriyel etkili NEO-KORT, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Neomisin ile antienflamatuvar etkiye sahip, sentetik bir kortikosteroid olan Deksmetazon sodyum fosfatın steril şartlarda hazırlanmış bir üründür.

Neomisin, Streptomyces fradiae kültüründen sentezlenen gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı bakterisit etkili bir antibakteriyeldir.

Deksmetazon sodyum fosfat yangı azaltıcı aktiviteye sahip sentetik bir kortikosteroiddir.

NEO-KORT, neomisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu göz ve kulak enfeksiyonlarında antibakteriyel ve antienflamatuvar etkili güçlü bir kombinasyondur.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

NEOKORT, evcil hayvanlarda bakteriyel veya alerjik nedenlerle oluşan; konjunktivitis, keratokonjunktivitis, keratitis, iritis, iridocyclitis v.b. gibi göz hastalıkları ile akut ve kronik otitis eksterna’da, suppuratif otitis eksterna’da, parazit infestasyonlarından sonra oluşan otitis eksterna’da ve kulak dermatitlerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Göz Hastalıklarında;

At ve sığırlarda: Günde 2- 3 defa her göze 4- 6 damla damlatılır.

Koyun, keçi, buzağı, kuzu, oğlak, köpek ve kedilerde: Günde 2- 3 defa her göze 2- 4 damla damlatılır.

Kulak Hastalıklarında:

Bütün evcil hayvanlarda vakanın şiddetine ve hayvanın türüne göre günde 2 defa 2- 3 damla, önceden kir ve iltihapları temizlenmiş olan kulak kanalına damlatılır. İnatçı vakalarda kulak içine NEO-KORT’lu bir tampon tatbik edilir.

Uygulama sıklığı durumun şiddetine göre değişir. İyileşme görülmeye başladıktan sonra doz dereceli olarak azaltılmalıdır. Uygulama 10 günden uzun sürmemelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

Viral enfeksiyonların varlığında kortikosteroidler enfeksiyonun seyrini kötüleştirebilir.

3 gün içerisinde herhangi bir iyileşme görülmediği veya durumun kötüleşmesi halinde teşhis yeniden gözden geçirilmelidir. Kulağa uygulanan bir şişenin daha sonra göze uygulanması doğru değildir. Bu nedenle göz ve kulak için ayrı ambalajların kullanılması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

İçerdiği kortikosteroid nedeniyle intraoküler basıncı artırabilir ve korneanın epitelizasyonunu inhibe edebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ototoksik olduğu bilinen ilaçlar ile bir arada kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) et ve süt için “0” gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

KONTRENDİKASYONLAR

Kortikosteroid içeren oftalmik preparatların kullanılması, korneanın derin ve ülserli lezyonlarında, mantar enfeksiyonlarında, glaukomlarda ve viral enfeksiyonların varlığında kontrendikedir.

Gebelikte kullanımı : Hayvanların gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz kanıtlanmamıştır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Işıktan uzakta, kuru ve serin yerde 25°C'nin altında muhafaza ediniz. Ambalaj açıldıktan sonra 15 gün içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 5 ml'lik opak beyaz plastik şişelerde arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:19.01.2017

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO : 13.08.98 9/831

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1
Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89
e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No.32 Kapaklı/Tekirdağ