

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

FULLTONIC **Enjeksiyonluk Çözelti** Vitamin - Aminoasit

BİLEŞİMİ

FULLTONIC Enjeksiyonluk Çözelti; pembe renkli, berrak bir çözeltidir, beher 100 ml'de;

l-karnitin hidroklorür (500 mg l-karnitine eşdeğer)	613,3 mg	Thioktik asit	20 mg
Pyridoksin hidroklorür	15 mg	Siyanokobalamin	3 mg
d,l-asetilmetionin	2 g	l-arjinin	240 mg
l-ornitin hidroklorür (120 mg l-ornitine eşdeğer)	153,2 mg	l-sitrullin	120 mg
l-lizin hidroklorür (50 mg l-lizine eşdeğer)	62,5 mg	Glisin	150 mg
Taurin	150 mg	Aspartik asit	150 mg
Glutamik asit	150 mg	Fruktoz	5 g
Sorbitol	8 g		

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FULLTONIC Enjeksiyonluk Çözelti, B grubu vitaminler, aminoasitler, l-karnitin ve şekerleri içeren damar içi, derialtı veya periton içi yolla yüksek hacimlerde kullanılmaya uygun enjeksiyonluk bir preparattır. İlacın formülasyonu, toksikozis, yorgunluk veya stres sonucu meydana gelen katabolitlerin elimine edilmesi veya inhibisyonu için gerekli olan metabolik işlemlerin başlatılmasında etkili olmak ve metabolizmadaki yapım faaliyetlerini destekleyici olmak temel kabul edilerek düzenlenmiştir.

Karaciğerin korunması ve lipotropik aktivitelerinde çok önemli bir rol oynayan Vitamin B₆ ve Vitamin B₁₂, metabolik faaliyetlerin meydana gelmesinde önemli rol alırlar.

Üründeki bazı amino asitler enzim reaksiyonları için gerekli koenzimlerin öncüsü ve/veya substratlardır. Bunlar: lipotropik ve karaciğeri koruyucu aktiviteye sahip *asetilmetiyonin*; *l-ornithin*; *l-arjinin*; *l-sitrullin* (kandaki nitrojen seviyesini düşürür); *l-lizin* (l-karnitin'in öncüsüdür.); *glisin*; *taurin*; *aspartik asit* ve nefro ve hepato-detoksifiye edici etkiye sahip *glutamik asittir*.

Yağların metabolizmasında koenzim rolü oynayan *thioktik asit*; karaciğerde yağ toplanması, infiltrasyonu ve hepatik nekroz safhalarında, lipotropik ve antinekrotik etki gösterir.

L-karnitin (sadece L formu aktiftir), organizma tarafından sentezlenecek miktarların tamamlayıcısı olarak gereklidir ve esterleşmemiş yağ asitlerinin oksidasyonunu kolaylaştırır.

Glukojenik ve anti-ketojenik etkiye sahip, hızlı aktive olan *fruktoz* ve daha az aktif olan *sorbitoldür*.

FULLTONIC Enjeksiyonluk Çözelti, ağır ve uzun süreli fiziksel güç kullanan tüm hayvanlarda (yüksek verim, spor, çalışma, hastalık ve sonrasında nekahat dönemi vs. gibi) protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını regüle etmek, hepatositler ve kas hücrelerini tekrar aktive etmek suretiyle etkileyen, yorgunluk önleyici ve detoksifiye edici bir üründür.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

FULLTONIC Enjeksiyonluk Çözelti, tüm hayvanlarda

Metabolik dengenin tekrar eski haline getirilmesi amacıyla;

- Vücudun direncinin düştüğü durumlar (uzun süreli aşırı aktivite ve düşük kas performansı, yüksek verim, stres)
- Hastalık sonrası nekahat dönemi
- Ketosis

Metabolizmayı destekleyici olarak da,

- Ruminotoksemiye takip eden intoksikasyonlar
- Gebelik toksemisi
- Sonun atılamaması
- Akut mastitis
- Sindirim ve barsak fonksiyon bozuklukları
- Mikotoksin intoksikasyonları
- İneklerin puerperal karaciğer koması (aşırı yağlanma) ve paraziter ve enfeksiyöz kökenli karaciğer hastalıkları
- Gebelik, beslenme bozuklukları
- Postoperatif iyileşme ve iştahsızlık hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Hayvan Türü	Kullanım Şekli	Dozu
Sığır, At ve tüm büyük erişkin ruminantlar	Damar İçi, Deri Altı, İntraperitoneal	Günde iki kere 250-500 ml.
Buzağı, manda yavrusu, tay, erişkin koyun ve keçiler	Damar İçi, Deri Altı, İntraperitoneal	Günde iki kere 250 ml.
Kuzu ve Oğlaklar	Damar İçi, Deri Altı, İntraperitoneal	Günde iki kere 20-40 ml/10 kg canlı ağırlık
Tavşan ve Kediler	Deri altı	Günde iki kere 2-4 ml/kg canlı ağırlık
Köpekler	Damar içi veya Deri altı	Günde iki kere 2-4 ml/kg canlı ağırlık

Endikasyon amacına, hastalığın şiddetine ve hastanın durumuna bağlı olarak tedaviye 3 – 10 gün süreyle devam edilebilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Önerilen kullanım şekil ve dozunda herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) et ve süt için “0” gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. Ürün açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 250 ml'lik Tip II renksiz cam şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.02.2017**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO:**

02.06.2009 – 21/057

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

Deva Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No.32 59510
Kapaklı/Tekirdağ