

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VETACLOX

Göz Merhemi

Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Vetaclox Göz Merhemi, steril, beyaz-krem renkli yağlı merhem olup, 5 gramlık şırıngada etkin madde olarak 835 mg kloksasiline eşdeğer 1065 mg kloksasilin benzatin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler: Kloksasilin 6 amino-penisillanik asitten elde edilen yarı sentetik bir penisilindir. Bakterisidal etkisini hücre duvarının sentezini engelleyerek gösterir. Duyarlı olan bakteriler arasında başlıca *Staphylococcus* sp. ve *Bacillus* sp. bulunur. Penisilinazlara dayanıklı olduğundan penisilin G'ye dirençli stafilokok suşlarına karşı da etkilidir. Penisilin bağlayıcı proteinler (PBP'ler) olarak bilinen membrana bağlı proteinlere bağlanırlar.

Farmakokinetik özellikler: Göze uygulandığında kan dolaşımına karışmamaktadır. Uygulandıktan sonra gözyaşı sıvısındaki yoğunluğu 2-3 gün boyunca etkili MİK seviyelerinin üzerinde seyrederek ve bu şekilde etkili bir tedaviye olanak sağladığı gibi kolay bir uygulamayı da mümkün kılmaktadır. Uygulamayı takiben yine gözyaşı sıvısı aracılığı ile vücuttan atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Vetaclox Göz Merhemi sığır, koyun, at, köpek ve kedide *Staphylococcus* spp, *Bacillus* spp, *Moraxella bovis* ve *Branhamella ovis* gibi bakterilerin neden olduğu göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Yalnızca topikal olarak uygulanır. Alt göz kapağı kaldırıldıktan sonra merhem sabit bir akışla alt konjonktival boşluğa yavaş yavaş sıkılır. Normalde tek bir uygulama yeterlidir, gerektiği takdirde 48-72 saat sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.

Sığır ve At: Bir göz için yaklaşık 5-10 cm'lik şerit merhem

Koyun: Bir göz için yaklaşık 5 cm'lik şerit merhem

Kedi ve Köpek: Bir göz için yaklaşık 2 cm'lik şerit merhem

Tek gözü enfekte olmuş hayvanlarda olası çapraz enfeksiyonun önlenmesi amacıyla her iki göze tedavi uygulanması tavsiye edilir. Enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için tedavi uygulamasının da önce sağlıklı gözden başlanması önerilir. Şırınga tek kullanımlıdır. Şırınga açıldıktan sonra ucunun kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. Kısmen kullanılmış şırıngalar atılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Özel kullanım uyarısı yoktur. Yalnızca harici kullanım içindir. Mümkün olduğunda, yalnızca duyarlılık testine dayalı olarak kullanılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik ve laktasyon dönemindeki hayvanlara uygulanabilir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler ile birlikte kullanılmamalıdır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Beta-laktamlara duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bulunmamaktadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan ürünler ya da atık materyaller yerel yasaların gerekliliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penisilinler ve sefalosporinler inhalasyon, yutma veya cilt teması sonrasında aşırı duyarlılığa (alerji) yol açabilir. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık sefalosporinler ile çapraz reaksiyonlara yol açabilir ve bunun tersi de söz konusudur. Bu maddelere karşı gelişen alerjik reaksiyonlar nadiren ciddi düzeyde olabilir. Duyarlı olduğunuzu biliyorsanız ya da söz konusu preparatlarla çalışmamanız tavsiye edilmişse, bu ürünü kullanmamalısınız. Ürünü, tüm önerilen önlemleri alarak ve maruziyetten kaçınmaya büyük özen göstererek kullanın. Maruziyetten sonra cilt kızarıklığı gibi semptomlar gelişirse, tıbbi yardım almalı ve doktora prospektüsü göstermelisiniz. Yüzün, dudakların ya da gözlerin şişmesi daha ciddi semptomlar olup, acil tıbbi müdahale gerektirmektedir. Kullanım sonrası eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında, buzdolabına ve/veya derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü 24 aydır. Şırınga tek kullanımlıktır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Beyaz plastik kapak ile kapatılmış 5 gram ürün içeren 8 ml'lik beyaz plastik şırıngalarda sunulmaktadır. 1 adet ve 20 adet şırınga içeren karton kutuların içerisinde prospektüs ile birlikte bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 21.02.2020

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 21.02.2020 – 029/0013

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ: Teknovet İlaç San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Osman Paşa Mah. 18. Sok. No:3 Çerkezköy/Tekirdağ