

## Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

### **GENTAVET-D**

Deri Merhemi

Antibakteriyel Merhem

### **BİLEŞİMİ**

GENTAVET-D Deri Merhemi, homojen görünümlü, beyazımsı renkte, özel kokulu bir merhem olup beher g'da 3 mg gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat ve yardımcı madde olarak antimikrobiyal koruyucu amaçlı 0,5 mg metil paraben (E218) ve 0,1 mg propil paraben (E216) içerir.

### **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ**

#### **Farmakodinamik özellikler**

GENTAVET-D Deri Merhemi, aminoglikozid grubuna dahil bir antibiyotik olan Gentamisin sülfat 'ın uygun sıvı maddeleri ile hazırlanmış bir mamüldür.

Gentamisin, bakterisid etkisini kendisine duyarlı bakterilerde, ribozomun 30 S alt ünitesine geri dönüşümsüz bağlanarak protein sentezini inhibe etmek suretiyle gösterir. Gram pozitif ve gram negatif bakterilerin patolojik türlerine karşı oldukça etkindir. Bu özelliğinden dolayı primer ve sekonder enfeksiyöz deri lezyonlarına başarıyla kullanılır. *Pseudomonas aureginosa*, *Proteus spp.*, *E. coli*, *Klepsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, Stafilokok ve Streptokok gruplarına etkileyen GENTAVET-D deri merhemi, Şap hastalığı, Ektima gibi hastalıklarda tırnak arası ve ağız mukozası yaralarının çabuk iyileşmelerinde etkilidir.

#### **Farmakokinetik Özellikler**

Gentamisin merhem formunda deriden yavaş bir şekilde emilir. Ancak hasar görmüş (yanık gibi) derinin geniş bir yüzeyine uygulandığında belirgin bir şekilde sistemik emilimin meydana gelebileceği ve istenmeyen etkilere neden olabilecek şekilde emilim hızı artabilir. Polar, hidrofilik özelliği nedeni ile ekstraselüler sıvıda dağılır ve dağılım hacmi küçüktür.

### **KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR**

Tüm hayvanlarda gentamisine duyarlı bakterilerin karıştığı deri enfeksiyonları ve yaralarının tedavisinde kullanılır.

### **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Mümkünse yara etrafındaki kıllar kırpılarak yara dezenfekte edildikten sonra yeterli miktarda GENTAVET-D Deri Merhemi gazlı bez ile yara kenarlarına ince bir tabaka halinde sürülür. Günde 3-4 kez uygulanabilir, tedavi süresi 4 ile 8 gündür. Şap hastalığı ile birlikte gelişen meme, ağız, dil ve tırnak aralarındaki yaralar üzerine bol miktarda GENTAVET-D Deri Merhemi uygulanmalıdır.

### **ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR**

Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı mantar vb. organizmaların üremesine yol açabilir. Böyle bir durumda antibiyotik uygulamasına son verilip, uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra en az 20-30 dakika süresince hayvanların etkilenmiş bölgeyi yalamasına izin verilmemelidir. Bu ürün hayvanlardan elde edilen bakterilere uygulanmış duyarlılık testi sonuçlarına, bölgesel veya ülkesel politikalara göre kullanılmalıdır. Eğer bu mümkün değilse tedavi hedef bakterilerle ilgili bölgesel epidemiyolojik bilgilere dayandırılmalıdır.

**Gebelik ve laktasyonda kullanım:** Gebe, emziren veya damızlık hayvanlar üzerinde özel bir çalışma yapılmamıştır. Veteriner hekim tarafından verilen fayda/risk raporu olmadıkça kullanmayınız.

### **İSTENMEYEN/YAN ETKİLER**

Hassas hayvanlarda irritasyon ve aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

### **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ**

Aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle, nörotoksik, nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır. Yine böbreklere zararlı etkileri olan tetrasiklinler, sulfonamidler gibi ilaçlar ile nöromuksuler blokaj yapıcı diğer ilaçlarla, anesteziklerle ve nonsteroidal antienflamuarla birlikte kullanılmamalıdır. Demir preparatları, furosemid, amfoterimisin B, polimiksin B, vankomisin, sefalotrin ile birlikte kullanılmaları durumunda böbrek ve iç kulak üzerindeki toksik etki artar. Gentamisin ampisilin sodyum, furosemid, sefalotin sodyum, heparin sodyum, sefapirin sodyum ile kullanılmamalıdır.

## **GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR**

**İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için “0” gündür.**

## **KONTRENDİKASYONLAR**

Aminoglikozitlere hassas olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

## **DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT**

Ürün uygulanması ile ilgili doz aşımı riski yoktur, acil durum prosedürlerine ihtiyaç duyulmamakta ve antidot kullanımı gerekmemektedir.

## **KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR**

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Her türlü atık/artık materyal atık su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

## **GENEL UYARILAR**

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

## **UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR**

Gentamisine duyarlı olduğu bilinen kişiler ürün ile temastan kaçınmalıdır. Göz ile temastan sakınılmalı, uygulama esnasında eldiven giyilmeli ya da uygulama sonrası eller yıkanmalıdır.

## **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Işıktan uzakta, kuru ve serin yerde, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan muhafaza edildiğinde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk açıldıktan sonra 25°C'nin altında buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklandığında raf ömrü 3 aydır.

## **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

Kutu içerisinde beyaz renkli PE kapaklı 20 g'lık gri renkli alüminyum tüplerde sunulmaktadır.

## **SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenahanelerinde satılır (VHR).

## **PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 11.11.2020**

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 26.09.1986 – 006/0532**

## **PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1  
Küçükçekmece/İstanbul e-mail: vetas@vetas.com.tr

Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89

## **ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ:**

DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32  
Kapaklı / Tekirdağ Tel: 0282 735 20 00 Faks: 0282 758 16 83