

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

TENİAKİLL

Enjeksiyonluk Çözelti

Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Teniakill Enjeksiyonluk Çözelti renksiz, açık sarı-sarı berrak, steril bir çözelti olup beher ml'de etkin madde olarak 56,80 mg prazikuantel ve yardımcı madde olarak antimikrobiyal koruyucu amaçlı 5 mg klorbutanol hemihidrat ve 75 mg benzil alkol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler: Prazikuantel, izokinolin bileşiklerinden geniş spektrumlu antihelmintik etkili bir ilaçtır. Kedi ve köpekte sestodların ergin ve larvalarına karşı etkilidir. Etki spektrumu tüm önemli sestod türlerini kapsar: *Echinococcus* spp, *Taenia* spp, *Dipylidium caninum*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocestoides* spp. Prazikuantel, parazit yüzeyinden hızla absorbe edilir ve parazit membranlarının Ca++ geçirgenliğini değiştirerek etki eder. Ergin sestodların kaslarında hızlı, sürekli bir kasılma ile paraliz ve metabolik bozukluğa yol açarak paraziti öldürür. Direnç mekanizması tam olarak açıklanamamaktadır. Şistosoma larvalarının doğal dirençli oldukları bildirilmiştir. Prazikuantele direncin, voltaj kapılı kalsiyum kanallarının beta alt ünitesinin iki amino asit sekanslarının varlığı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Farmakokinetik özellikler: Deri altı ve kas içi yollardan verilen prazikuantel, uygulama yerinden hızla ve tümüyle emilir. Maksimum serum konsantrasyonlarına 2 saat içinde ulaşılır. Karaciğerde metabolize edilir. Değişmemiş prazikuantelin yarı ömrü 1 ila 2.5 saat, prazikuantel ve metabolitlerin yarı ömrü (radyoaktivite olarak ölçülür) 4 saattir. %85 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Önemli bir enterohepatik döngüden geçer. Metabolitler arasında ana metabolit prazikuantel türevi olan 4-hidroksisikloheksildir. Prazikuantel, başlıca idrar, safra ve feçes yoluyla metabolitleri halinde tamamen elimine edilir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Kedi ve köpekte prazikuantele duyarlı *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Hydatigena (Taenia) taeniaeformis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia ovis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp. ve *Joyeuxiella pasqualei* gibi gastrointestinal sestodların neden olduğu hastalıkların tedavisi ve kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kedi ve köpekte farmakolojik dozu 5.68 mg prazikuantel/kg vücut ağırlığı olup, pratik olarak 10 kg vücut ağırlığına 1 ml kas içi (IM) ve deri altı (SC) uygulanır. Bir hayvanda kullanılacak ilaç miktarı 3 ml'yi geçiyorsa ilaç kas içi veya iki kısma bölünerek iki ayrı yere deri altı uygulanmalıdır. *Echinococcus* enfestasyonundan şüphe ediliyorsa ilaç mutlaka kas içi uygulanmalıdır. Tedaviden önce diyet veya aç bırakma önlemleri gerekli değildir. Doğru dozu belirlemek için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Pireler, şeritler için ara konakçı olabileceklerinden enfeksiyonun oluşmaması için hayvanların üzerlerinin ve barınaklarının uygun bir insektisit ve akarisit ile ilaçlanması tavsiye edilir. Ara konakçı kontrolü sağlanmadığı takdirde şerit tedavisi tekrar edilmelidir. *D. caninum*'un gelişme süresi kısa olduğundan köpek ve kedilerin her iki haftada bir Teniakill Enjeksiyonluk Çözelti ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi sonrası atılan şerit yumurtaları, toprakta bulunan akarlar için bir enfeksiyon kaynağıdır. Tedavi sonrasında çıkan gaita iyice imha edilmelidir.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım: Önerilen dozlarda gebe hayvanlarda kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Parenteral uygulama sonrasında kedi ve köpeklerde sıklıkla görülebilecek istenmeyen etkiler; kusma, salya artışı, ishal ve iştahsızlıktır. Uygulama sonrası görülebilecek diğer semptomların halsizlik, uyuşukluk ve ataksi (koordinasyon bozuklukları) olduğu bildirilmiştir. Özellikle belirtilen istenmeyen etkiler dışında yan etki oluşması durumunda derhal veteriner hekime danışılmalıdır. Kilosu ağır köpeklerde deri altı verilen ilaç miktarından dolayı hassasiyet, hassas hayvanlarda da hafif ağrı görülebilir. Bu yan etkiler kısa süreli ve geçicidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Nematositler dahil diğer ilaçlarla kombinasyon halinde uygulanabilir. Etkin madde olarak piperazin içeren bir vermifüj ile eşzamanlı olarak uygulanmamalıdır. Dekametazon ile aynı anda kullanıldığında prazikuantelin plazma konsantrasyonu yarı yarıya düşmektedir. Uyumluluk çalışmalarının olmaması durumunda diğer veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Köpeklerde terapötik dozun 10 katı ve kedilerde 20 katı uygulandığında kusma gözlenmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Aktif ve yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığı bulunan kedi ve köpeklerde kullanmayınız. Dört haftadan küçük kedi ve köpeklerde kullanmayınız. Av köpeklerinde kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Cilt/mukoza ve gözlerle doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Temas halinde su ile iyice durulanmalıdır. Veteriner tıbbi ürünler ile çalışırken sigara içmeyiniz, yemek yemeyiniz veya içecek içmeyiniz. Yanlışlıkla kendi kendine enjeksiyon durumunda, hemen tıbbi yardım alınız ve ürünün prospektüsünü veya etiketini hekime gösteriniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında, buzdolabına ve/veya derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü 36 aydır. Açıldıktan sonra 25°C'nin altında 28 gün içinde kullanılmalı ve buzdolabında ve/veya derin dondurucuda saklanmamalıdır. Tıpası en fazla 40 kez delinebilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Ürün veya ürüne ait boş/dolu ambalajlar sulara, su kaynaklarına veya yakın yerlerine atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde kırmızı renkli klorobutil 20 mm lastik tıpa ve beyaz flip-off kapak ile kapatılmış 20 ml ve 50 ml'lik amber renkli Tip II cam flakonlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.11.2022

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

21.11.2022 – 031/0005

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

DEVA Holding A.Ş. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:
32 59510 Kapaklı/Tekirdağ Tel: 0 282 735 20 00 Faks: 0 282 758 16 83